

- Se presenti ferite protelgeree come da indicazioni mediche.
 - Utilizzare su cutie integre.
 - Non utilizzare in caso di uso magistrale o una magistrale.
 - Il tigre deve essere indossato con una magistrale o una magistrale.
 - La magistrale a le istruzioni frame parte del dispositivo medico.
 - La magistrale/alterazione del dispositivo medico escludo ogni responsabilità.
 - Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/rimanere il contatto tra il dispositivo e un liquido, olio, soluzioni grasso o acide.
 - Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnicco ortopedico su **MD** in modo da non portare ad una perdita di funzionalità del prodotto.
 - Il tigre prevede come accessorio il dispositivo ACC-CTRL che permette di effettuare il collegamento con il collare CLL-901 avendo la fabbricante fgp.

AVVERTENZE D'USO

CONTRINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ecocardiologo a controllopedico, non dà luogo a contraindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

Salutogenic approach to social norms—tolerance; instabilities of social norms—tolerance have operability.

INDICAZIONI: tutte le distinzioni alla limitazione del range di movimento del rango vertebrale compreso tra 10 e 60°, quando richiesto nel trattamento di colonna vertebrale confezione della D10 ed L5, come ad esempio: deformità posturale o scoliosi lombare (singolo o combattuta); rettamento conservativo di lombago; deformità posturale o scoliosi lombare (singolo o combattuta); rettamento conservativo di lombago.



F35 TRICONTROL PLUS

Iperestensore vertebrale a 3 punti basculante telescopico



Orthopedic & Rehabilitation Equipment



avvenute nelle istituzioni, in combinatoria con quelle fornite dal tecnico per il progetto di un impianto presenti, che formano parte integrante delle istituzioni. Per ogni impianto si determina la sua specifica problematica insorta in conseguenza della sua disposizione rispetto alle norme di sicurezza e alla legge. I dati raccolti sono esclusivamente di natura quantitativa e si riferiscono alle condizioni di salute del paziente, la cui gravità determina direttamente la probabilità di ricovero. Inoltre, si presta attenzione alla dimensione monetaria dell'impianto, che consente di valutare la sua redditività.

l prodotto può essere smaltito con i rifiuti domestici.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo protetto da calore, dell'esposizione diretta alla luce del sole e della umidità.

SIMBOLI	SIGNIFICATO
	Non lavare a secco
	Non stirare
	Non asciugare in asciugatrice
	Non candeggiare
	Lavaggio a mano. Non massimizzare la temperatura di 30° con saponi e liquidi.

ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE:

INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

AVVERTENZA


La prima applicazione del tutore al paziente e le successive regolazioni devono essere fatte solo ed esclusivamente da personale specializzato che dovrà seguire le indicazioni del medico curante.

Verificare le dimensioni del tutore in rapporto alla conformazione anatomica del paziente.


1. Per la regolazione del tutore sul paziente, sganciare la chiusura **C. FAST&SAFE** e la chiusura **C. EASY RING** che si trovano sulle zone laterali del tutore; allentare poi tutte le viti delle aste ascellari (fig. 4) e laterali (figg. 2-3).
2. Posizionare il tutore al paziente come in fig. 1. Se necessario modellare le aste in base alla fisionomia del paziente.
3. Regolare l'iperestensore in altezza, gli snodi laterali dovranno posizionarsi sulle creste iliache e la pelota frontale sullo sterno (fig. 5).
4. Regolare l'appoggio sternale TR utilizzando come riferimento le tacche graduate da 10 gradi (fig. 7).
5. **Stringere a fondo tutte le viti dell'asta ascellare (fig. 4)** e **le viti laterali delle aste laterali (cerchiate in figg. 2-3)**.

Chiedere al paziente di sedersi per accertarsi che il tutore sia stato applicato in modo corretto e non crei fastidio.

Se necessario procedere ad una nuova regolazione.



BLOCCO SBLOCCO PANCIALE




Grazie alla conformazione dello snodo è possibile, utilizzando i due cursori laterali, bloccare il movimento basculante nel punto di massima estensione.

REGOLAZIONE DELLA PELOTA POSTERIORE


Posizionare la pelota lombare orizzontalmente o verticalmente (figg. 7-8) come prescritto dal medico curante.

Assicurarsi che la placca lombare sia ben centrata sulla colonna vertebrale.



MODELLAZIONE


Se necessario è possibile adattare il tutore alla conformazione anatomica del paziente modellando: banda pelvica (A), gli ascellari (B), le aste laterali (C) all'altezza del bacino (per una modellazione più precisa utilizzare dei mordiglioni) e la pelota sternale (D).



APPLICAZIONI SUCCESSIVE: PER IL PAZIENTE

Rimuovere l'ortesi solo ed esclusivamente con il consenso del medico curante.

1. Per indossare il tutore vanno sganciate la chiusura **C. FAST&SAFE** e la chiusura **C. EASY RING** che si trovano sulle zone laterali del tutore.
2. Per lo sgancio della chiusura **C. FAST&SAFE**, tirare la leva di sblocco (fig. 4A).
3. Indossare il tutore avendo cura che il cuscinetto sternale in alto appoggi esattamente sullo sterno (fig. 1A). Far passare la cintura d'appoggio lombare dietro la schiena. Agganciare e chiudere la chiusura **C. EASY RING**, in modo che non risulti troppo stretto, (fig. 2A). Nel caso ciò si verificasse, sganciare e regolare il nastro a strappo.



Attenzione: Per togliere il tutore aprire la chiusura **C. FAST&SAFE** tirando la leva di sblocco (fig. 4A) e poi la chiusura **C. EASY RING**, portando avanti il cinturino (fig. 5A) e solo successivamente quando è completamente libera, rimuovere.

4. Per bloccare la chiusura **C. FAST&SAFE** premere la maniglia (fig 3A).